

Hvad er et keglesnit?


Det er en lille operation, hvor man fjerner det område omkring livmodermunden, hvor celleforandringerne sidder.

Hvornår skal der laves et keglesnit?

Operationen foretages oftest, når celleprøven eller vævsprøverne har påvist sværere celleforandringer på livmoderhalsen (afhængig af din alder).

Er der følger efter et keglesnit?

Der er en lille risiko for at føde for tidligt på ca. 1 %.



Bedøvelse

Operationen laves i lokalbedøvelse. Du er således vågen, men kan ikke mærke smerter ved operationen. Det ligner meget den fornemmelse, som du mærkede, da du fik taget vævsprøver.

Operationen

Med en el-slynge udskæres det stykke på livmoderhalsen, hvor celleforandringerne sidder.

Operationen varer kun ganske kort tid, som regel under 10 minutter.

Normalt kan du gå hjem igen umiddelbart efter indgrebet.

Efterforløb

Rekreation

Du skal ikke anstrenge dig fysisk hårdt i de første 2 uger, men holde dig lidt i ro. Såret kan springe op og bløde, det er derfor, at du ikke må lave noget fysisk anstrengende.

Du tilrådes sygemelding i 2 dage efter operationen.

Smerter

Det er almindeligt at få lette menstruationslignende smerter i underlivet i nogle dage.

Vi anbefaler dig i så fald at tage smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks:

Tbl. Paracetamol 1 g højst 4 gange dagligt

Eventuelt kan du samtidigt tage:

Tbl. Ibuprofen eller Ipren 400 mg højst 3 gange dagligt.

Blødning

De fleste bløder ikke ret meget efter operationen. I stedet kan du få øget mængde udflåd. Dette kan vare ved op til en måned. Det er ikke tegn på betændelse, men skyldes det indvendige sår i slimhinden, som producerer sårvæske.

Hvis du bløder, kan blødningen vare et par uger efter operationen. Blødningen

kan være som ved en normal menstruation.

Ca. 1½ uge efter operationen kan der forekomme øget blødning igen i forbindelse med afstødning af sårskorpen. Dette kræver ingen behandling og holder hurtigt op af sig selv.

Næste menstruation kan du forvente til normal tid.

For at såret ikke springer op anbefaler vi, at du i de næste 2 uger (eller længere hvis du stadig bløder):

- Undgå samleje
- Undgå karbad, svømmehal og havbad
- Undgå brug af tampon
- Ikke lave hård fysisk aktivitet.

Problemer

Hvis du bløder kraftigere end ved normal menstruation, får meget kraftige underlivssmerter, får feber (over 38 ° C) eller får puslignende udflåd, skal du kontakte klinikken.

Du kan ringe hverdage kl. 9.00-11.30 på tlf. 8619 8822 (undt. onsdag) eller kl. 12.30-13.00 på tlf. 3074 4722 (undt. onsdag)

Hvis det er udenfor klinikens åbningstid, kontaktes din egen læge eller vagtlægen.

Svar og plan

Svar på undersøgelsen af vævet fra kegleoperationen foreligger efter ca. 3 uger. Vævet undersøges for graden af celleforandringer og for, om celleforandringerne er helt væk.

Du får svar pr. mail via lægevejen. Svaret foreligger ca. 3 uger efter operationen. I mailen vil der også være oplysning om den videre kontrol.

Du kan læse mere om celleforandringer på livmoderhalsen under Kræftens Bekæmpelse:
<http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/forstadier/Celleforandringer+livmoderhalsen/>

Jan. 2015
Rev. 2015-04-30
Rev. 2017-04-21
Rev. 2017 -05-30
Rev. 21-05-2019
Rev. 13-09-2023
Rev. 2026-09-01

Keglesnit (Conisatio)

Pernille Daugaard
Speciallæge i Gynækologi
Park Alle 3, 1.th
8000 Århus C
Tlf. 86 19 88 22
www.bernilledaugard.dk